

FONO TACO

225756556



TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE

MEDICAMENTO: RIVAROXABAN

Funcionamiento de la Unidad

Como Unidad Poli Anticoagulante Oral (Poli-TACO), nosotros solamente vemos el anticoagulante. La enfermedad que amerite TACO y el resto de sus patologías deberán ser controladas en APS u hospital. No se dan licencias médicas.

Los horarios en que puede encontrar a los funcionarios de la Unidad tanto para sus controles como para llamado por teléfono son:

- Lunes a jueves **8:00 a 12:30**
- Lunes a jueves **14:00 a 16:30**
- Viernes de **8:00 a 12:30**

El POLI TACO no tiene estacionamiento para pacientes, solo se permite dejar y retirar a paciente.

¿Qué es el anticoagulante?

- El anticoagulante es un medicamento que “vuelve más líquida” su sangre (anticoagulada)
- Disminuye el riesgo de formación de trombos (coágulos). En caso de que ya se haya formado, disminuye el riesgo que crezca o se migre
- La dosis del medicamento va a depender según la función del riñón
- No debe tomar dosis olvidada al día siguiente, solo la que corresponda en ese día. **No tomar una dosis significa aumentar el riesgo de generar un trombo.**
- Al estar tomando estas pastillas debe evitar situaciones de riesgo que involucren cortes y golpes, sobre todo en la cabeza

¿Como debo tomar el medicamento?

- A diferencia de otros anticoagulantes, este medicamento se debe tomar cada 12 o 24 horas (según indicación médica)
- La hora la define el paciente, pero debe ser a la misma hora

¿Como deben ser mis comidas?

- A diferencia de otros anticoagulantes, este medicamento no se ve afectado por comidas de color verde (alimento alto en vitamina K), por lo que la dieta no se modifica por el anticoagulante y debe mantener la indicada según otras patologías
- Este medicamento se debe tomar CON comidas, a diferencia del Acenocumarol/Warfarina
- NO CONSUMIR ALCOHOL porque aumenta el riesgo de sangrado.

¿Puedo consumir otros medicamentos?

- Puede tomar todos los demás medicamentos, pero solo los indicados por un médico. Recuerde avisarle que toma Anticoagulante para que evalúe la interacción
- A diferencia de otros anticoagulantes, no se ve tan afectado por tomar otros medicamentos. **AVISAR SIEMPRE A MÉDICO TRATANTE EN CASO DE TOMAR MEDICAMENTOS PARA VIH Y ANTIMICÓTICO (Como Ketoconazol)**

¿Como serán los controles?

En caso que la indicación de Rivaroxabán sea permanente o indefinida:

- Tendrá controles en PoliTACO cada 6 meses para otorgar nueva receta de los medicamentos
- **SERÁ MUY IMPORTANTE ACUDIR CON EXAMEN ACTUALIZADO DE CREATININA** (Función renal), válido con fecha máxima 6 meses de antigüedad → SOLICITAR ORDEN EL MES ANTES DE QUE SE ACABE RECETA (QUINTO MES)
- El retiro del medicamento es de manera mensual, directamente en farmacia del TACO. No es necesario que acuda el paciente, basta un representante con receta

En caso que la indicación de Rivaroxabán sea por tiempo definido:

- Se entregará receta por 3 o 6 meses según indicación médica
- Deberá mantener controles con médico tratante en Hospital o APS de la patología
- En caso de requerir extensión de la terapia, deberá traer nueva interconsulta o contrarreferencia que indique nueva duración de TACO

¿Qué pasa si me someteré a un procedimiento o alguna cirugía?

- Siempre tiene que avisarles a los demás médicos que está tomando anticoagulante
- En caso de requerir pases para realizar procedimientos puede solicitarlos en POLITACO
- Programarse para solicitarlo una semana de anticipación y programar si requiere suspender o no el anticoagulante

¿Qué hacer en caso de sangrado?

El anticoagulante no causa sangrado, pero puede hacer que este sea de mayor gravedad.

- En caso de sangrado que presionar con gasa limpia hasta que se detenga
- Si el sangrado es persistente o de cuantía que no logra controlar, debe acudir a SAPU más cercano o Servicio de Urgencia

¿Me puedo vacunar tomando anticoagulante?

- Puede vacunarse con toda vacuna al tomar anticoagulante
- No necesita pase