



IMAGEN DE REFERENCIA POST CIRUGÍA



GARANTÍA GES


Colecistectomía preventiva del cáncer de vesícula en personas de 35 a 49 años

Todo beneficiario entre 35 y 49 años:

- Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- El tratamiento consiste en la **intervención quirúrgica**, la cual se realizará dentro de **90 días** desde la confirmación diagnóstica.

Pasado este período, si su cirugía aún no ha sido resuelta, usted puede solicitar a Fonasa derivación a segundo prestador.



UNIDAD PRE QUIRÚRGICA UBICADA EN ANTIGUO HOSPITAL SAN JOSÉ



DIRECCIÓN:
SAN JOSÉ 1053
BELISARIO PRATS 1597



En caso de dudas, escribir al correo:
unidad.prequirurgica@redsalud.gob.cl




INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA COLELITIASIS



UNIDAD PRE QUIRÚRGICA

¿QUÉ ES LA COLELITIASIS?

Se refiere a la **formación de cálculos en el interior de la vesícula biliar**. Los cálculos biliares son pequeñas piedras hechas de colesterol (grasa) y aunque al comienzo no suelen presentar ningún tipo de problemas, pueden llegar en ocasiones a diversas complicaciones.



¿EN QUÉ CONSISTE LA CIRUGÍA?




La **colecistectomía** es la extirpación de la **vesícula** y de las **vías biliares**.



REQUISITOS PRE-QUIRÚRGICOS

- Evaluación médica y de enfermería.
- Exámenes preoperatorios (sangre, orina y electrocardiograma).
- Ecotomografía abdominal, en algunos casos colangiografía o ERCP.
- Evaluación de anestesia.
- Patologías de base compensadas.

CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA



Son **pequeñas incisiones en la pared abdominal** que permite la visión del órgano a extraer con la ayuda de una lente óptica.

AUNQUE SON MÍNIMAS, USTED PUEDE PRESENTAR ESTE TIPO DE COMPLICACIONES TRAS LA CIRUGÍA:

- Infección de la herida operatoria.
- Hernia abdominal.
- Hemorragia.
- Pancreatitis.



CUIDADOS POST OPERATORIOS

- Asistir a la hora de control según la fecha indicada.
- No mojar ni retirar apósito.
- Seguir su pauta nutricional entregada al alta.
- No fumar ni beber alcohol.

▶ SIGNOS DE ALARMA ▶

Asistir al servicio de urgencias en caso de: **dolor intenso, sangrado que no cesa, calor local, secreción con mal olor en zona operatoria, fiebre sobre 38 °C sostenida.**