

QUE HACER SI OLVIDO ADMINISTRAR UNA DOSIS

Adminístrelo en cuanto lo recuerde o pueda administrarlo y omítalo al día siguiente.

No se administre una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si es posible, debe regresar a su programa de administración habitual la semana siguiente.

CONSERVACIÓN DE CORDOXENE SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG/ML

- Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.
- Conservar en refrigerador (entre 2°C y 8°C), en la zona de las verduras
- No congelar.
- Las jeringas deben conservarse en su envase original, protegidas de la luz.
- No utilizar Cordoxene® solución inyectable 40 mg/mL después de la fecha de vencimiento indicada en la caja.
- La fecha de vencimiento es el último día del mes que se indica.
- Deseche cualquier jeringa que contenga partículas.
- Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura, se pueden traer a farmacia central para que sean eliminados de forma correcta.

SITIOS DE INYECCION ACETATO DE GLATIRAMER (CORDOXENE)




E.U. Isabel Díaz Meza
Dr. Ricardo Hughes
Unidad de Neurología

ELIJA UN LUGAR PARA LA INYECCION SIGUIENDO LOS DIAGRAMAS.

Hay siete posibles zonas para la inyección en su cuerpo.


Área 1: Área del estómago (abdomen) alrededor del ombligo. Evite poner la inyección 5 cm a cada lado del ombligo.



Áreas 2 y 3: Muslos (sobre sus rodillas)



Áreas 4, 5, 6 y 7: Parte superior de los brazos, y parte superior de las caderas (debajo de la cintura)



Dentro de cada área existen múltiples lugares para la inyección.

Elija un lugar diferente, así reducirá la posibilidad de irritación o de dolor en el lugar de la punción.

Advertencia: no se inyecte en ninguna zona que esté dolorida o sin color, o en dónde usted note nudos o bultos firmes e informe a su enfermera.