

Una vez indicado el medicamento la enfermera de neurología lo pondrá en contacto con la empresa encargada de realizar la capacitación online para la administración del medicamento

Se controlará con un hemograma y prueba hepática al mes de iniciado el tratamiento y luego cada 6 meses junto con el control médico.

Informar al médico si durante el tratamiento presenta síntomas depresivos, ideación suicida o alucinaciones.

ELIMINACION.

El autoinyector desechable y las agujas, se deben eliminar en una caja de cortopunzante, botella plástica o tarro pequeño y pueden ser entregadas en farmacia central para su eliminación.

Ante dudas escribir a isabelm.diaz@redsalud.gob.cl



MEDICAMENTO AVONEX

Interferón beta-1a



E.U. Isabel Díaz
Neurólogos:
Dra. Alicia Muñoz
Dr. Ricardo Hughes

La **ESCLEROSIS MÚLTIPLE** es una enfermedad de por vida que afecta el sistema nervioso mediante la destrucción de la cubierta protectora (mielina) que rodea las fibras nerviosas.

AVONEX se indica para el tratamiento de la esclerosis múltiple, disminuyendo el número de brotes de la enfermedad y retrasando la aparición de algunos de los síntomas como la discapacidad física que es común en personas con esta enfermedad.

Este medicamento se administra mediante una inyección intramuscular 1 vez por semana a través de un autoinyector



El sitio de punción es la zona del muslo que se debe ir rotando para evitar daño de la piel



Durante los primeros meses de tratamiento se producen síntomas pseudogripales, por lo que se indica tomar analgésicos 1 hora antes de la inyección y hasta 4 horas después de la inyección

Se recomienda inyectar antes de dormir, para que los síntomas ocurran durante el periodo de sueño y no interfieran en las actividades de la vida diaria

RETIRO Y ALMACENAMIENTO

El medicamento se debe retirar mensualmente en la farmacia central que se encuentra en el subterráneo del hospital San José, lo puede hacer el paciente o algún familiar presentando la receta.

Horario de retiro: lunes a jueves de 8:15hrs a 16:00hrs, viernes de 8:15hrs a 15:00hrs

El traslado del medicamento se debe hacer manteniendo la cadena de frío (cooler con unidad refrigerante)

En casa almacenar en las bandejas centrales del refrigerador, no muy pegadas a las paredes, jamás colocar en la hielera o en la puerta del refrigerador