

MODO DE ADMINISTRACION

lavado de manos antes y después de tomar el medicamento

Cada pastilla viene en una caja individual debe tomarse los comprimidos con agua

Tragarlos sin masticar

no debe tomar otro medicamento 3 horas antes o después de tomar la cladribine

tomar las pastillas inmediatamente después de abrir el blíster

si algún comprimido está roto o fragmentado, no tomar y avisar a la enfermera

tomar en el mismo horario

las superficies que estuvieron en contacto con el medicamento deben ser limpiadas con agua y jabón

no tomar mas de la dosis diaria recomendada

los desechos deben ser guardados en un contenedor y entregados en farmacia central para su eliminación



Ante dudas escribir a isabelm.diaz@redsalud.gob.cl

CLADRIBINA MAVENCLAD



La **ESCLEROSIS MULTIPLE** es una enfermedad de por vida que afecta el sistema nervioso mediante la destrucción de la cubierta protectora (mielina) que rodea las fibras nerviosas.

E.U. Isabel diaz meza
Dr. Ricardo Hughes

ESQUEMA DE TRATAMIENTO DE CLADRIBINA

La dosis de medicamento se administra durante 2 años, en 2 meses seguidos, cada mes con 1 semana de tratamiento.

Los siguientes 2 años son libres de tratamiento y exámenes

Al quinto año el neurólogo evaluará la necesidad de una nueva dosis

Cada pastilla viene en una caja individual

PRIMER AÑO	AÑO		MES		
DIA DE LA SEMANA 1					
FECHA					
DOSIS DE COMPRIMIDOS					
DIA DE LA SEMANA 2					
FECHA					
DOSIS					

SEGUNDO AÑO	AÑO		MES		
DIA DE LA SEMANA 1					
FECHA					
COMPRIMIDOS					
DIA DE LA SEMANA 2					
FECHA					
DOSIS					

Trate de tener un horario fijo para tomar el medicamento diariamente, si olvida tomarlo tome la dosis que omitió tan pronto como la recuerde.

Si esto ocurre al día siguiente, el ciclo de terapia debe extenderse un día más, nunca tomar 2 dosis juntas

MECANISMO DE ACCION

Se eliminan los linfocitos autoreactivos, esperando que los nuevos linfocitos no generen el cuadro inmunológico que daña la mielina.

SEGUIMIENTO

Durante los 2 primeros años se realizara un hemograma posterior al tratamiento en el mes 3 y 7 junto al control médico

Fecha mes 3	
Fecha mes 7	

Los controles posteriores con neurólogo serán según indicación medica

Las mujeres en edad fértil deben evitar el embarazo mediante algún método anticonceptivo

La planificación del embarazo puede iniciarse 6 meses después de la última dosis del año 2

Los hombres deben tomar precauciones para evitar el embarazo de su pareja durante los 2 primeros años de tratamiento y hasta 6 meses después de la última dosis del año 2