

RETIRO Y ALMACENAMIENTO

El medicamento se debe retirar mensualmente en la farmacia central que se encuentra en el subterráneo del hospital San José, lo puede hacer el paciente o algún familiar presentando la receta.

Horario de retiro: lunes a jueves de 8:15hrs a 16:00hrs, viernes de 8:15hrs a 15:00hrs

El traslado del medicamento se debe hacer manteniendo la cadena de frío (cooler con unidad refrigerante)

En casa se debe mantener en el compartimiento de las verduras

Ante dudas escribir a
isabelm.diaz@redsalud.gob.cl

ACETATO DE GLATIRAMER (CORDOXENE)



E.U. Isabel Díaz
Dr. Ricardo Hughes
Unidad neurología

CORDOXENE es un medicamento indicado para el tratamiento de la **esclerosis múltiple recurrente remitente**

actúa modificando el modo en que funciona el sistema inmunitario de su cuerpo.

Se cree que los síntomas de la esclerosis múltiple se producen por un defecto en el sistema inmunitario del organismo que produce zonas de inflamación en el cerebro y la médula espinal.

CÓMO USAR CORDOXENE SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG/ML

Siga exactamente las instrucciones de administración de Cordoxene® indicadas por su médico.

La dosis es una jeringa precargada (40 mg de Glatiramer acetato) que se administra 3 veces por semana

la vía de administración es subcutánea

Se recomienda administrar el medicamento los mismos días de la semana.

Retirar la jeringa del refrigerador una hora antes para que esté a temperatura ambiente

Antes de administrar revisar la fecha de vencimiento

El líquido debe ser transparente, no usar si está turbio o tiene partículas y avisar a su enfermera

Una vez indicado el medicamento la enfermera de neurología lo pondrá en contacto con la empresa encargada de realizar la capacitación para la administración del medicamento

Se controlará con un hemograma y prueba hepática al mes de iniciado el tratamiento y luego cada 6 meses junto con el control médico.

ELIMINACION

las agujas, se deben eliminar en una caja de cortopunzante y pueden ser entregadas en farmacia central para su correcta eliminación.

RECOMENDACIONES

si desea embarazarse lo ideal es informar al neurólogo, aunque no presentaría riesgo durante el embarazo o la lactancia

Si presenta alguna reacción alérgica debe dirigirse a un servicio de urgencia y avisar a médico tratante y enfermera de neurología.