

SIEMPRE TENER PRESENTE

Durante el tratamiento y hasta 2 meses después de discontinuarlo las vacunas pueden ser menos efectivas. La vacuna anti influenza y la del COVID pueden colocarse. Las vacunas atenuadas vivas tienen mayor riesgo de presentar la infección y deben evitarse: 3 vírica (sarampión, rubeola, paperas), BCG, fiebre amarilla, varicela y viruela.

Si desea planificar un embarazo debe informar a su médico, este medicamento no se puede tomar si usted esta embarazada o amamantando

La exposición al sol debe ser con la debida protección

Hay un mayor riesgo de desarrollar infecciones por lo que debe estar atenta a los síntomas que se detallan en librito que será entregado por la enfermera.

fingolimod puede causar inflamación en la parte posterior del ojo, por lo que debe informar al médico o la enfermera si nota alteraciones visuales

Si le indican medicamentos para la arritmia cardiaca, debe informar que está tomando fingolimod y avisar al neurólogo.



MEDICAMENTO FINGOLIMOD



E.U. Isabel Diaz Meza
Dr. Ricardo Hughes
Unidad de Neurología

El fingolimod es un medicamento para el tratamiento de la **esclerosis múltiple recurrente remitente**. Actúa al disminuir la acción de las células inmunes que pueden causar daño a los nervios.

El inicio del tratamiento con fingolimod puede causar la disminución de la frecuencia cardiaca, por lo que la primera administración será en el CDT, donde la enfermera realizará monitorización de signos vitales, además, de la realización de un electrocardiograma al inicio y al final de las 6 horas de observación.

TENER PRESENTE AL TOMAR EL MEDICAMENTO

Trate de tener un horario fijo para tomar el medicamento diariamente, si olvida tomarlo tome la dosis que omitió tan pronto como la recuerde. Sin embargo, si ya casi es hora de la próxima dosis, omita la dosis que le faltó y llame a su médico antes de tomar la siguiente dosis.

Recordar retirar el medicamento en la farmacia central de forma mensual y 2 o 3 días antes de que se acaben.

Si deja de tomar fingolimod por al menos 1 día durante su primer mes de tratamiento o deja de tomarlo por más de 2 semanas después de haber tenido más de un mes de tratamiento, el efecto inicial en su frecuencia cardiaca puede ocurrir nuevamente, por lo que se debe realizar nuevamente la monitorización por 6 horas en el CDT.

CUIDADOS DURANTE EL TRATAMIENTO

Será derivado a evaluación de oftalmología a los 4 meses de iniciado el tratamiento

Se realizara pruebas hepáticas y hemograma en los meses: 1,3,6,9 y 12 y luego según indicación medica

Los controles médicos serán al mes 1 y 3 después de iniciado el tratamiento y luego según indicación médica

Si sospecha tener un brote debe dirigirse al servicio de urgencia, si presenta alguna molestia que no sea grave puede venir a Neurologia con la enfermera para agendar una hora con su médico tratante.

Ante dudas puede escribir al correo electrónico: isabelm.diaz@redsalud.gob.cl

